

Einige Resultate meiner Zuchten.

Mitgetheilt von Fritz A. Wachtl in Wien.

Diptera. *)

1. *Phorostoma parvula* Ports. lebt als Parasit in den Larven von *Saperda populnea* L. Ich zog die Fliege Mitte Mai aus den Gallen, welche dieser Käfer auf den Aesten strauchartiger Aspen (*Populus tremula* L.) erzeugt (Galicia, Moravia).

2. *Masicera (Ceromasia) agilis* Mg. zog ich (7. April) in Mehrzahl und einzelne Stücke von

3. *Exorista flavicans* Mg. (18—22. Mai) aus den Puppen von *Bupalus piniarius* L. (Moravia).

4. *Nemorilla notabilis* Meig. entwickelte sich im Juli aus Raupen des auf Brombeeren lebenden Wicklers *Aspis Udmaniana* L. (Austr. super.).

5. *Nemorilla maculosa* Mg. parasitirt auch in den Raupen von *Tortrix murinana* Hb., woraus ich die Fliege am 1. Juli erhielt (Austr. infer.).

Hymenoptera.

1. *Lochites papaveris* Först. zog ich Mitte Mai aus vorjährigen Samenköpfen der *Centaurea paniculata* L., welche Gallen von *Aulax jaceae* Schk. enthielten, dessen Parasit er ist (Austr. infer.).

2. *Diomorus armatus* Boh. habe ich gleichzeitig mit *Diomorus calcaratus* Nees aus den Gallen von *Cynips Kollari* Hrtg. erhalten (Galicia).

3. *Syntomaspis lazulina* Först. wurde von mir auch aus den Gallen von *Dryophanta cornifex* Hrtg. erzogen (Austr. infer.).

4. *Oligosthenus stigma* Fabr. lebt als Parasit auch in den Gallen von *Rhodites spinosissimae* Gir. (Moravia).

5. *Torymus nobilis* Boh. schmarotzt in den Gallen von *Cynips subterranea* Gir. (Austr. infer.).

6. *Torymus ventralis* Fonscol., dessen Lebensweise bisher noch unbekannt war, zog ich im April aus vorjährigen Gallen der *Hormomyia Fischeri* Frfld., welche ich auf *Carex acuta* L. fand (Austr. infer.).

7. *Torymus fuscipes* Boh. ist Parasit von *Cecidomyia saliciperda* Duf. (Austr. infer.).

*) Vergleiche auch diese Zeitg. I. Jahrg. 1882, pag. 276 u. 295.